This Question Paper contains 16 Printed Pages.
(Part- A & Part-B)

Sl. No.

પ્રશ્ન પેપરનો સેટ નંબર Set No. of Question Paper
8

050(G)

(MARCH, 2015)

Part-A : Time : 1 Hour / Marks : 50
Part-B : Time : 2 Hours / Marks : 50

PART - A

Time : 1 Hour] ***[Maximum Marks : 50***

સૂચનાઓ :

1. આ પ્રશ્નપત્રનાં વિભાગ-**A** માં બહુ વિકલ્પ પ્રકારના (M.C.Q.) **50** પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે.

2. પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા **1** થી **50** છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ **1** છે.

3. કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો.

4. આપને અલગથી આપેલ **OMR** પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) ○, (B) ○, (C) ○ અને (D) ○ આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.

5. પ્રશ્નપત્રનાં ઉપરની જમણી બાજુના આપેલા પ્રશ્નપત્રક સેટ નંબર ને **OMR** પત્રકમાં આપેલી જગ્યામાં લખવાનું રહેશે.

6. રફ કાર્ય હેતુ આ ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.

7. વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્કયુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે.

1. $|\bar{x}|=|\bar{y}|=1$ અને $|\bar{x}, \hat{\bar{y}}|=\theta$,

તો $|\bar{x}-\bar{y}\cos\theta|=$ .....

(A) $\cos\theta$ (B) $\sin^2\theta$

(C) $\sin\frac{\theta}{2}$ (D) $\sin\theta$

2. $\bar{x}=(1, k, 3)$ અને $\bar{y}=(2,-1, 5)$ એ પરસ્પર લંબસદિશો હોય,

તો $k=$ .....

(A) 10 (B) 15

(C) 13 (D) 17

3. $|\bar{x}|=2, |\bar{y}|=3, |\bar{z}|=5$ તથા $\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}=\bar{0}$,

તો $\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{y}\cdot\bar{z}+\bar{z}\cdot\bar{x}=$ .....

(A) -19 (B) -38

(C) 0 (D) 19

4. α, β, γ એ સદિશ $\bar{x}$ ના દિક્‌ખૂણાઓ હોય,

તો $\cos 2\alpha+\cos 2\beta+\cos 2\gamma=$ .....

(A) 2 (B) -1

(C) 0 (D) 1

5. (3, 4) ને લંબ એકમ સદિશ ..... છે.

(A) $\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ (B) $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$

(C) $\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ (D) $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

6. $|(\cos\theta\sin\alpha, \cos\alpha, -\sin\theta\sin\alpha)|=$ .....

(A) 0 (B) -1

(C) 2 (D) 1

7. $\int_1^3 \log x \, dx = ...$

(A) $-2 + \log 9$ (B) $2 + \log 27$

(C) $\log\left(\frac{27}{e}\right)$ (D) $-2 + \log 27$

8. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x \sin x \, dx = ...$

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{2}{3}$

(C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

9. સંકલનની મદદથી વક્ર $y = x$, X-અક્ષ અને રેખાઓ $x = 1$ તથા $x = 10$ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ..... છે.

(A) 99 (B) $\frac{99}{2}$

(C) 50 (D) 100

10. વક્ર $y = 5 \sin x$; $0 \le x \le \pi/2$, X-અક્ષ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ..... છે.

(A) 1 (B) $\frac{5}{2}$

(C) $\frac{1}{5}$ (D) 5

11. વક્રો $y = x^2$ તથા $y = x$ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ..... છે.

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{1}{6}$

12. ગોલકના ઘનફળનો તેના પૃષ્ઠફળ S ને સાપેક્ષ વૃદ્ધિ દર ..... થાય.

(A) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

(B) $\frac{1}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

(C) $4\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

(D) $\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

13. એક વસ્તુના x એકમના વેચાણમાંથી થતી કુલ આવક

$R(x) = 10x^2 + 20x + 1500$ દ્વારા મળે છે.

$x = 2015$ હોય, ત્યારે સીમાંત આવક ..... થાય.

(A) 40320 (B) 403

(C) 40300 (D) 4032

14. $\cos^{-1}(-0.49)$ નું આસન્ન મૂલ્ય ..... છે.

(A) $\frac{2\pi}{3} - \frac{1}{50\sqrt{3}}$

(B) $\frac{\pi}{3} - \frac{1}{50\sqrt{3}}$

(C) $\frac{\pi}{3} + \frac{1}{50\sqrt{3}}$

(D) $\frac{2\pi}{3} + \frac{1}{50\sqrt{3}}$

15. જો $y = f(x) = \sin x$ હોય, તો તેનો વિકલ dy = ...,

જ્યાં $x = \pi/6$, $dx = 0.01$ છે.

(A) $\sqrt{3}$ (0.05)

(B) $\sqrt{3}$ (0.5)

(C) $\sqrt{3}$

(D) $\sqrt{3}$ (0.005)

16. $\int_a^b \frac{\log x}{x}\,dx$ = ... (જ્યાં $a, b \in R^+$)

(A) $\frac{1}{2}\log ab$

(B) $\log\left(\frac{b}{a}\right)$

(C) $2\log\left(\frac{b}{a}\right)$

(D) $\frac{1}{2}\log(ab)\log\left(\frac{b}{a}\right)$

17. $\int_0^1 x(1-x)^{11}\,dx$ = ...

(A) $\frac{1}{156}$ (B) $\frac{1}{121}$

(C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{132}$

18. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos 2x}{(\sin x+\cos x)^2}\,dx$ = ...

(A) $\pi/2$ (B) 0

(C) $-\pi/4$ (D) $\pi/4$

19. $\int_0^5 \sqrt{25-x^2}\,dx$ = ...

(A) $\frac{25\pi}{4}$ (B) $\pi/4$

(C) $\frac{25}{4}$ (D) 25π

20. $f(x) = x^{3/5}(4-x)$, $x \in R^+ \cup \{0\}$ ની નિર્ણાયક સંખ્યાઓ ..... છે.

(A) $0, \frac{3}{2}$

(B) $0, \frac{2}{3}$

(C) $0, -\frac{2}{3}$

(D) $0, -\frac{3}{2}$

21. પદાર્થકણની ગતિનું સમીકરણ $s = t^3 - 6t^2 - 15t$ છે. s મીટરમાં તથા t સેકન્ડમાં છે. તો પદાર્થકણ સ્થિર થાય, ત્યારે $t =$ .....

(A) 1

(B) 5, 1

(C) 0

(D) 5

22. $(at^2, 2at)$ પ્રચલ સમીકરણવાળા વક્રનો સ્પર્શક ..... આગળ X- અક્ષને લંબ છે. $t \in R$.

(A) $(a, 2a)$

(B) $(0, 0)$

(C) $(a, -2a)$

(D) $(4a, 4a)$

23. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ પરના $\left(\frac{a}{2\sqrt{2}}, \frac{a}{2\sqrt{2}}\right)$ બિંદુએ અભિલંબનું સમીકરણ ..... છે.

(A) $y = 1$

(B) $x = 0$

(C) $x = y$

(D) $2x + y = 0$

24. $\int \sqrt{1+\sin\frac{x}{4}}\,dx = \ldots\ldots + c$

(A) $\sin\frac{x}{8}+\cos\frac{x}{8}$

(B) $\frac{1}{8}\left(\sin\frac{x}{8}-\cos\frac{x}{8}\right)$

(C) $8\left(\sin\frac{x}{8}-\cos\frac{x}{8}\right)$

(D) $8\left(\sin\frac{x}{8}+\cos\frac{x}{8}\right)$

25. $\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}\,dx = \ldots\ldots + c$

(A) $x\tan x$

(B) $x\tan\frac{x}{2}$

(C) $\frac{x}{2}\tan x$

(D) $\frac{x}{2}\tan\frac{x}{2}$

26. $\int_0^{\pi/4} \tan^{100} x\,dx + \int_0^{\pi/4} \tan^{102} x\,dx = \ldots.$

(A) $\frac{1}{102}$

(B) $\frac{1}{100}$

(C) 101

(D) $\frac{1}{101}$

27. $x + y + z = 1$ નું $x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma = P$ સ્વરૂપ ..... છે.

(A) $\frac{x}{2\sqrt{3}} + \frac{y}{2\sqrt{3}} + \frac{z}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

(B) $\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{y}{\sqrt{3}} + \frac{z}{\sqrt{3}} = 1$

(C) $\frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{y}{\sqrt{3}} + \frac{z}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

(D) $x + y + z = 1$

28. યામાક્ષો સાથે એકરૂપ ખૂણા બનાવતી અને $(2, -3, 5)$ માંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ ..... થાય. $(k \in R)$

(A) $\bar{r} = (2, -3, 5) + k\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(B) $\bar{r} = (2, -3, 5) + k\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(C) $\bar{r} = (2, -3, 5) + k(-1, 1, 1)$

(D) $\bar{r} = (2, -3, 5) + k(1, 1, 1)$

29. $\bar{r}\cdot(1, 2, -1) = 3$ અને $2x - y + 2z = 2$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ .....

(A) $\cos^{-1}\frac{5\sqrt{3}}{9}$ (B) $\sin^{-1}\frac{\sqrt{6}}{9}$

(C) $\pi - \cos^{-1}\frac{\sqrt{6}}{9}$ (D) $\tan^{-1}\frac{5}{\sqrt{2}}$

30. જે રેખાઓની દિક્ સંખ્યાઓ l, m, n અને $m-n, n-l, l-m$ હોય, તેવી રેખાઓ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ ..... છે.

(A) $\pi/6$ (B) $\pi/2$

(C) $\pi/3$ (D) $\pi/4$

31. $\int \frac{e^{5\log x} - e^{3\log x}}{e^{4\log x} - e^{2\log x}}\, dx = \ldots\ldots + c$

(A) $e^3 \log x$

(B) $\frac{x^3}{3}$

(C) $\frac{x^2}{2}$

(D) $e^2 \log x$

32. $\int e^x \left\{\frac{1+(1+x^2)\tan^{-1}x}{1+x^2}\right\} dx = \ldots\ldots + c$

(A) $\frac{x}{1+x^2}$

(B) $e^x \tan^{-1} x$

(C) $\frac{e^x}{1+x^2}$

(D) $x \tan^{-1} x$

33. $\int e^{7x+\log x}\, dx = \ldots\ldots + c$

(A) $\frac{e^{7x}}{49}(7x-1)$

(B) $\frac{e^x}{49}(7x-1)$

(C) e^{7x}

(D) $e^{7x}(7x-1)$

34. X - અંત:ખંડ 4, Y - અંત:ખંડ (– 6), Z - અંત:ખંડ 3 બનાવતા સમતલનું સમીકરણ ..... છે.

(A) $3x - 2y + 4z = 12$

(B) $4x - 6y + 3z = 1$

(C) $4x - 3y + 2z = 12$

(D) $3x - 4y + 6z = 12$

35. સમતલ $2x - z + 1 = 0$ નું સદિશ સમીકરણ ..... છે.

(A) $\bar{r} \cdot (2, -1, 0) + 1 = 0$

(B) $\bar{r} \cdot (2, 0, -1) + 1 = 0$

(C) $\bar{r} \cdot (2, 0, -1) = 1$

(D) $\bar{r} \cdot (2, -1, 0) = 1$

36. $(2, 2, -3)$ અને $(1, 3, 5)$ માંથી પસાર થતી રેખાનું કાર્તેઝીય સ્વરૂપ ..... છે.

(A) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{8}$

(B) $\frac{x-1}{7} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{8}$

(C) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-5}{-3}$

(D) $\frac{x-2}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{8}$

37. ઊગમબિંદુ થી સમતલ $\bar{r} \cdot (3, 4, 12) = 65$ નું લંબ અંતર ..... છે.

(A) 5

(B) 13

(C) 65

(D) 1

38. વક્રના કોઈ બિંદુ (x, y) આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ અને તે બિંદુના y - યામનો ગુણાકાર એ બિંદુના x - યામ જેટલો હોય, તો તે વક્ર ..... દર્શાવે છે.

(A) પરવલય

(B) ઉપવલય

(C) લંબાતિવલય

(D) વર્તુળ

39. અતિવલય $x^2 - y^2 = 8$ પરના બિંદુ (3, 1) આગળના અવાભિલંબની લંબાઈ ..... છે.

(A) $\frac{1}{3}$ (B) 8

(C) $\frac{1}{8}$ (D) 3

40. એક શહેરની વસ્તીનો વધારો પ્રતિવર્ષ 4% છે, જો t સમયમાં શહેરની વસ્તી p હોય, તો p નું t નાં સ્વરૂપમાં સમીકરણ ..... છે.

(A) $p = 4 \cdot e^{\frac{t}{25}}$ (B) $p = c \cdot e^{\frac{t}{25}}$

(C) $p = \frac{1}{25} e^{4t}$ (D) $p = e^{\frac{t}{25}}$

41. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} = -4xy^2$, $y(0) = 1$ નો વિશિષ્ટ ઉકેલ ..... છે.

(A) $x^2 = \frac{1}{y^2}$ (B) $y = x^2 + \log x$

(C) $4e^x + \frac{1}{y^2} = 8$ (D) $y = \left(2x^2 + 1\right) = 1$

42. સદિશો $\bar{x}$ અને $\bar{y}$ માટે $[2\bar{x} + 3\bar{y} \quad \bar{x} \quad \bar{y}] =$ .....

(A) $6(\bar{x} \times \bar{y})$ (B) $6\,|\bar{x}|^2$

(C) 1 (D) 0

43. ઉપવલય $x^2 + 4y^2 = 1$ થી આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ..... છે.

(A) π (B) 2π

(C) 4π (D) $\pi/2$

44. વક્ર $y^2 = 2x$, Y-અક્ષ અને રેખા $y = 2$ દ્વારા આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ ..... છે.

(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{9}{2}$

(C) 8 (D) $\frac{8}{3}$

45. વિકલ સમીકરણ $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 = \sin y + 3x$ ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે ..... છે.

(A) 2, 3

(B) 3, વ્યાખ્યાયિત નથી.

(C) વ્યાખ્યાયિત નથી, 2

(D) 3, 2

46. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} = y \tan x + e^x$ નો સંકલ્યકારક અવયવ .... છે.

(A) $\sec x$ (B) $\cos x$

(C) $\cot x$ (D) $\sin x$

47. તૃતીય કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વિશિષ્ટ ઉકેલમાં આવતાં, સ્વૈર અચળોની સંખ્યા ..... છે.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 0

48. $\int \left(x^6+7x^5+6x^4+5x^3+4x^2+3x+1\right) e^x \, dx = \ldots. + c$

(A) $\sum_{i=1}^{6} x^i e^x$

(B) $\sum_{i=0}^{6} i \, e^x$

(C) $\sum_{i=0}^{6} (ex)^i$

(D) $\sum_{i=1}^{7} x^i e^x$

49. $\int (1-\cos x)\,\text{cosec}^2 x \; dx = \ldots\ldots\ldots\ldots + c$

(A) $\cot\left(\frac{x}{2}\right)$

(B) $\frac{1}{2}\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

(C) $2\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

(D) $\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

50. $\int \frac{\cot x \; dx}{\sqrt{\cos^4 x+\sin^4 x}} = \ldots\ldots. + c$

(A) $-\frac{1}{2}\log\left|\cot^2 x+\sqrt{\cot^4 x+1}\right|$

(B) $\frac{1}{2}\log\left|\tan^2 x+\sqrt{\tan^4 x+1}\right|$

(C) $-\frac{1}{2}\log\left|\cot x+\sqrt{\cot^4 x+1}\right|$

(D) $\frac{1}{2}\log\left|\cot^2 x+\sqrt{\cot^4 x+1}\right|$

050(G)

(MARCH, 2015)

PART - B

Time : 2 Hours] ***[Maximum Marks : 50***

સૂચનાઓ :

1. સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
2. આ પ્રશ્નપત્રનાં વિભાગ-**B** માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ **1** થી **18** પ્રશ્નો આપેલા છે.
3. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. આંતરિક વિકલ્પો આપેલા છે.
4. પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
5. નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
6. પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
7. વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્કયુલેટરનો ઉપયોગ કરી શકશે.

વિભાગ - A

● નીચે આપેલ **1** થી **8** પ્રશ્નોના જવાબો માંગ્યા મુજબ આપો. દરેક પ્રશ્નના **2** ગુણ છે. **16**

1. $f(x) = 6x + 3\cot x$ ના મહત્તમ તથા ન્યૂનતમ મૂલ્યો શોધો, જ્યાં $x \in (0, \pi)$.
2. $xy + ax + by = 2$ પરનાં $(1, 1)$ બિંદુ આગળ સ્પર્શકનો ઢાળ 5 છે, તો a અને b મેળવો.
3. $\int x\sqrt{x^4+64}\,dx$ મેળવો.
4. $\int \frac{\left(e^x-1\right)}{\left(e^x+1\right)\sqrt{e^x+1+e^{-x}}}\,dx$ મેળવો.
5. વક્ર $y = x^2 - 3x + 2$ નું X-અક્ષ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો.

   અથવા

   પરવલય $y = x^2 + 2$ તથા રેખાઓ $y = x$, $x = 3$ અને $x = 0$ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
6. એકમ સદિશો $\bar{x}$ અને $\bar{y}$ માટે સાબિત કરો કે $\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}\left|\bar{x}+\bar{y}\right|$, જ્યાં $\left(\bar{x}, \hat{\ }\bar{y}\right) = \alpha$.
7. $(a_1, 1, 1)$, $(1, a_2, 1)$, $(1, 1, a_3)$ સમતલીય સદિશો હોય, તો સાબિત કરો કે $\sum_{i=1}^{3} \frac{1}{1-a_i} = 1$.
8. રેખા $x = 3z + 2$, $y = 2 - 5z$ ની દિક્કોસાઈન શોધો.

   અથવા

   સાબિત કરો કે $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{5}$ તથા $\frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{-2}$ વિષમતલીય રેખાઓ છે.

વિભાગ - B

● નીચેના **9** થી **14** સુધીના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. દરેક પ્રશ્નનાં **3** ગુણ છે. **18**

9. સરવાળાના લક્ષ તરીકે $\int_a^b \sin x \, dx$ મેળવો.

અથવા

કિંમત મેળવો : $\int_{-1}^{2} |2x-1| \, dx$

10. બે વર્તુળો $x^2 + y^2 = 1$ અને $(x-1)^2 + y^2 = 1$ વડે આવૃત્ત સામાન્ય પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો.

11. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} = \sin(x+y)$ નો ઉકેલ મેળવો.

અથવા

પ્રારંભિક શરત $y(e) = 0$ ને આધીન વિકલ સમીકરણ $x \cdot e^{y/x} - y + x\frac{dy}{dx} = 0$ નો વિશિષ્ટ ઉકેલ મેળવો.

12. સદિશની મદદથી સાબિત કરો કે $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$.

13. જો કોઈ રેખા સમઘનના વિકર્ણો સાથે $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ માપના ખૂણા બનાવે,

તો સાબિત કરો કે $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma + \cos^2\delta = \frac{4}{3}$.

14. બિંદુ $(1, 5, 1)$ નું સમતલ $x - 2y + z + 5 = 0$ ની સાપેક્ષ પ્રતિબિંબ મેળવો.

વિભાગ - C

● નીચેના **15** થી **18** સુધીના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. દરેક પ્રશ્નનાં **4** ગુણ છે. **16**

15. પાણીની એક ટાંકી ઊંધા શંકુ આકારની છે. તેના પાયાની ત્રિજ્યા 8 મીટર તથા ઊંચાઈ 12 મીટર છે. ટાંકીને સફાઈ માટે 4 મી^{3} / મિનિટ નાં દરથી ખાલી કરવામાં આવી રહી છે. જ્યારે પાણીની ઊંડાઈ 6 મીટર હોય, ત્યારે પાણીની સપાટીની ઊંચાઈ ઘટવાનો દર શોધો.

16. $\int e^{4x} \sin 8x \cos x \, dx$ મેળવો.

અથવા

$\int \frac{(3x+2)}{(x+1)(x+2)(x-3)} \, dx$ મેળવો.

17. $\int_0^1 \tan^{-1}\left(\frac{1}{1-x+x^2}\right) dx$ ની કિંમત મેળવો.

18. એક ઓરડામાં મૃતદેહનું તાપમાન 100° F છે. 5 મિનિટ બાદ મૃતદેહનું તાપમાન 50° F થાય છે. ત્યારબાદ બીજી 5 મિનિટ પછી તેનું તાપમાન 40° F થાય છે, તો તેના આસપાસના વાતાવરણનું અચળ તાપમાન શોધો.

SUBJECT:	50		MEDIUM:	G

QUE	ANS	QUE	ANS	QUE	ANS
1	D	21	D	41	X
2	D	22	B	42	D
3	A	23	C	43	D
4	B	24	C	44	A
5	B	25	B	45	A
6	D	26	D	46	B
7	D	27	C	47	D
8	A	28	D	48	A
9	B	29	D	49	D
10	D	30	B	50	A
11	D	31	C		
12	B	32	B		
13	A	33	A		
14	A	34	A		
15	D	35	B		
16	D	36	D		
17	A	37	A		
18	B	38	C		
19	A	39	D		
20	A	40	B		

વિભાગ A

(1)

$f(x) = 6x + 3\cot x$

$f'(x) = 6 - 3\operatorname{cosec}^2 x$

$f''(x) = 0 - 3(2\operatorname{cosec} x)(-\operatorname{cosec} x \cdot \cot x)$

$= 6\operatorname{cosec}^2 x \cdot \cot x$

$f(x)$ ના સ્થાનિક મહત્તમ કે ન્યૂનતમ મેળવવા $f'(x) = 0$ લેતાં

$6 - 3\operatorname{cosec}^2 x = 0$

$3\operatorname{cosec}^2 x = 6$

$\operatorname{cosec}^2 x = 2$

$\operatorname{cosec} x = \pm\sqrt{2}$

પરંતુ $\operatorname{cosec} x \neq -\sqrt{2}$ કારણ કે $x \in (0, \pi)$ માટે,

$\operatorname{cosec} x > 1$ થાય.

$\operatorname{cosec} x = \sqrt{2}$

$x = \frac{\pi}{4}$ અથવા $\frac{3\pi}{4}$

હવે પ્રથમ કસોટી $f''(x)$ નો ઉપયોગ કરો.

$f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = 6\operatorname{cosec}^2\frac{\pi}{4}\cot\frac{\pi}{4}$

$= 6(2)(+1)$

$= +12 > 0$

આથી $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ એ સ્થાનિક ન્યૂનતમ મૂલ્ય છે.

વિભાગ.....A.....

4

$f''\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\operatorname{cosec}^2\frac{3\pi}{4}\cot\frac{3\pi}{4}$

$= 6(\sqrt{2})^2(-1)$

$= -6\times 2$

$= -12 < 0$

આથી $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ એ સ્થાનિક મહત્તમ કિંમત છે.

$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 6\left(\frac{\pi}{4}\right) + 3\cot\frac{\pi}{4}$

$= \frac{3\pi}{2} + 3$

$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\left(\frac{3\pi}{4}\right) + 3\cot\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

$= \frac{9\pi}{2} - 3$

આથી સ્થાનિક મહત્તમ માટે $x = \frac{3\pi}{4}$ આપણે મેળવ્યું.

$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{9\pi}{2} - 3$

સ્થાનિક ન્યૂનતમ $x = \frac{\pi}{4}$ આગળ મળે.

$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\pi}{2} + 3$

(2) $xy + ax + by = 2$

$x\frac{dy}{dx} + y + a + b\frac{dy}{dx} = 0$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{(a+y)}{(x+b)}$

પ્રશ્ન અનુસાર વક્ર પરનો $(1, 1)$ આગળનો ઢાળ 5 છે.

આથી ઉપરના સમીકરણમાં મૂકતાં,

$5 = -\frac{(a+1)}{(1+b)}$

વિભાગ.....A.....

5

$5+5b=-a-1$

$a+5b+6=0$ ——→ (i)

ઉપરોક્ત વક્ર $(1,1)$ બિંદુ આપી પસાર થાય છે. આપેલ વક્રનું સમીકરણ નીચે પ્રમાણે થશે.

$(1)(1)+a(1)+b(1)=2$

$a+b=1$ ——→ (ii)

~~$a+5b+6=0$~~

સમી. (i) પરથી, $a+5b+6=0$

સમી. (ii) પરથી, $a+b-1=0$

$4b+7=0$

$b=-\frac{7}{4}$ કિંમત (ii)માં મૂકતાં,

$a-\frac{7}{4}=1$

$a=\frac{7}{4}+1=\frac{11}{4}$

આમ, $a=\frac{11}{4}$ $b=-\frac{7}{4}$ મળે.

(3) $I=\int x\sqrt{x^4+64}\,dx$ ——→ (i)

$x^2=t$ આદેશ લેતાં,

$2x\,dx=dt$

$x\,dx=\frac{dt}{2}$ કિંમત (i)માં મૂકતાં,

$I=\frac{1}{2}\int\sqrt{t^2+64}\,dt$

વિભાગ.....A.....

પ્રશ્ન ક્રમાંક 6

$$I = \int \frac{1}{2}\sqrt{t^2+64}\,.\,dt$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{t}{2}\sqrt{t^2+64} + \frac{64}{2}\log\left|t+\sqrt{t^2+64}\right|\right] + C$$

$$I = \frac{x^2}{4}\sqrt{x^4+64} + 16\log\left|x^2+\sqrt{x^4+64}\right| + C$$

($t = x^2$ કિંમત મૂકતાં)

(4)

$$I = \int \frac{(e^x-1)}{(e^x+1)\sqrt{e^x+1+e^{-x}}}\,dx$$

$$= \int \frac{(e^x-1)}{(e^x+1)\sqrt{e^x+1+\frac{1}{e^x}}}\,dx$$

$$= \int \frac{(e^x-1)e^x\,dx}{(e^x+1)\sqrt{e^{2x}+e^x+1}}$$

$e^x = t$ મૂકતાં,

$e^x\,dx = dt$

$$I = \int \frac{(t-1)\,dt}{(t+1)\sqrt{t^2+t+1}}$$

$$= \int \frac{(t+1-2)\,dt}{(t+1)\sqrt{t^2+t+1}}$$

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{t^2+t+1}} - 2\int \frac{dt}{(t+1)\sqrt{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\sqrt{3}}}$$

વિભાગ.....A.....

7

(4) $I = \int \frac{(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})}{(e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}})\sqrt{(e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}})^2 - 1}} dx$ (અંશમાં હરનો $e^{\frac{x}{2}}$ નો ગુણાકાર)

$e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}} = t$ આદેશ કરો,

$\frac{1}{2}(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})dx = dt$ $(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})dx = 2dt$

$I = 2\int \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$

$= 2\sec^{-1}(t) + C$

$\boxed{I = 2\sec^{-1}(e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}) + C}$

(5) વક્ર $y = x^2 - 3x + 2$

$= x^2 - 3x + \frac{9}{4} - \frac{1}{4}$

$y + \frac{1}{4} = (x - \frac{3}{2})^2$



(5) $y = x^2 + 2$

રેખા $y = 0$

અહીં આપેલ પ્રદેશ આકૃતિમાં દર્શાવ્યો છે.

આપેલ પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ $A = |I_1| - |I_2|$

જ્યાં $I_1 = \int_0^3 x^2 + 2\, dx$

$= \left[\frac{x^3}{3} + 2x\right]_0^3$

$= 9(\frac{3^3}{3} + 2(3)) - 0$

$= 9 + 6 = 15$ ચોરસ એકમ

વિભાગ.....A.....

$$I_2 = \int_0^3 x\,dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^3$$

$$= \frac{(3)^2}{2} - 0$$

$$I_2 = \frac{9}{2}$$

આપેલ ગોળામાં મેળવેલું ખોખલું A = $|I_1| - |I_2|$

$= 15 - \frac{9}{2}$

$= \frac{21}{2}$

આમ આપેલ ગોળામાં આપેલ મેળવેલું ખોખલું $\frac{21}{2}$ એકમ છે.

(6) આપેલ $|\vec{x}| = |\vec{y}| = 1$

$|\vec{x}+\vec{y}|^2 = |\vec{x}|^2 + |\vec{y}|^2 + 2\vec{x}\cdot\vec{y}$

$= (1)^2 + (1)^2 + 2|\vec{x}||\vec{y}|\cos\alpha$

(જ્યાં $\alpha = (\vec{x}, \vec{y})$)

$= 1 + 1 + 2(1)(1)\cos\alpha$

$= 2 + 2\cos\alpha$

$= 2(1+\cos\alpha)$

$|\vec{x}+\vec{y}|^2 = 2 \times 2\cos^2\frac{\alpha}{2}$

$\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{4}|\vec{x}+\vec{y}|^2$

$\boxed{\cos\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}|\vec{x}+\vec{y}|}$

(આપેલ) $\alpha \in (0, \pi)$

$\frac{\alpha}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$

આથી, (ઉપરના) $|\vec{x}+\vec{y}| \neq 0$ આપેલ.

વિભાગ....A.....

$\therefore \cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}|\bar{x}+\bar{y}|$

(7) ઉપરો છે

$A(a_1,1,1)$ $B(1,a_2,1)$ $C(1,1,a_3)$ સમતલીય

હોવાથી છે.

$\therefore \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 \\ 1 & a_2 & 1 \\ 1 & 1 & a_3 \end{vmatrix} = 0$ થાય.

$= \begin{vmatrix} a_1-1 & 0 & 1-a_3 \\ 0 & a_2-1 & 1-a_3 \\ 1 & 1 & a_3 \end{vmatrix} = 0$ $(R_{31}(-1), R_{32}(-1)$ કરતાં)

$= (a_1-1)[(a_2-1)a_3-(1-a_3)] + (1-a_3)[0-(a_2-1)] = 0$

~~$(1-a_1)[a_3(1-a_2)]$~~

$a_3(a_1-1)(a_2-1) - (a_1-1)(1-a_3) + (1-a_3)(a_2-1) = 0$

અહીં $a_1 \neq 1$ $a_2 \neq 1$ $a_3 \neq 1$ હોવાથી

બંને બાજુ ભાગીને $(1-a_1)(1-a_2)(1-a_3) \neq 0$

થાય તેથી,

$= \frac{a_3(1-a_1)(1-a_2) + (1-a_3)(1-a_1) + (1-a_3)(1-a_2)}{(1-a_1)(1-a_2)(1-a_3)} = 0$

$= \frac{a_3}{1-a_3} + \frac{1}{1-a_2} + \frac{1}{1-a_1} = 0$

$\frac{a_3}{1-a_3} + 1 + \frac{1}{1-a_2} + \frac{1}{1-a_1} = 1$ (બંને બાજુ $\frac{1}{1-a_3}$ ઉમેરતાં)

$\frac{a_3+1-a_3}{1-a_3} + \frac{1}{1-a_2} + \frac{1}{1-a_1} = 1$

વિભાગ..... A .....

10

$= \frac{1}{1-a_3} + \frac{1}{1-a_2} + \frac{1}{1-a_1} = 1$

$\sum_{i=1}^{3} \frac{1}{1-a_i} = 1$

(8) આપેલ $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{5}$ ...(1)

$\bar{a} = (1,-1,1)$ $\bar{l} = (3,2,5)$

તથા આપેલ $\frac{x+2}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{-2}$ ...(2),

$\bar{b} = (-2,1,-1)$ $\bar{m} = (4,3,-2)$

$\bar{l} \times \bar{m} = (3,2,5) \times (4,3,-2)$

$= (-19, 26, 1)$

$\bar{b} - \bar{a} = (-2,1,-1) - (1,-1,1)$

$= (-3, 2, -2)$

$(\bar{b} - \bar{a}) \cdot (\bar{l} \times \bar{m}) = (-19, 26, 1) \cdot (-3, 2, -2)$

$= 57 + 52 - 2$

$= 107 \neq 0$

આપણી આપેલ બંને રેખાઓ વિક્ષેપવાળી રેખા થઈ.

વિભાગ.....B.....

(9) $I = f(x) = \int_a^b \sin x \cdot dx$

અહીં આપેલ વિધેય $f(x) = \int_a^b \sin x\,dx$ માં $x \in [a,b]$ એ આપણે લીધેલ આપેલ અંતરાલના n સરખા ઉપઅંતરાલોમાં વિભાજિત કરતાં દરેક ઉપઅંતરાલની લંબાઈ $h = \frac{b-a}{n}$ થાય.

અહીં જો $n \to \infty$ તો $h \to 0$ થાય.

$$\therefore I = \lim_{h\to 0} h \sum_{i=1}^{n} f(a+ih)$$

(અહીં $a=a$ અને $b=b$ છે.
$f(a+ih) = \sin(a+ih)$ થાય)

$$I = \lim_{h\to 0} h \sum_{i=1}^{n} \sin(a+ih)$$

$$= \lim_{h\to 0} h\,[\sin(a+h) + \sin(a+2h) + \cdots + \sin(a+nh)]$$

$$= \lim_{h\to 0} h \left[\frac{\cos(a+\frac{h}{2}) - \cos(a+nh+\frac{h}{2})}{2\sin\frac{h}{2}}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{h\to 0} \frac{\cos(a+\frac{h}{2}) - \cos(a+b-a+\frac{h}{2})}{\frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}} \quad (\because nh = b-a)$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\cos(a+\frac{h}{2}) - \cos(b+\frac{h}{2})}{\lim_{h\to 0} \frac{\sin\frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}}$$

વિભાગ..... B

12

$= \cos a - \cos b$

$\therefore I = \cos a - \cos b$

10 વર્તુળ :- 1 $x^2 + y^2 = 1$ ——→ (i)

વર્તુળ :- 2 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ——→ (ii)



આમ (i) અને (ii) માંથી y^2 ની કિંમત

મેળવતાં,

$x^2 = (x-1)^2$

$x^2 = x^2 - 2x + 1$

$x = \frac{1}{2}$ આ કિંમત (i) માં મૂકતાં,

$\frac{1}{4} + y^2 = 1$

$y^2 = \frac{3}{4}$

$y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

વિભાગ..... B .....

13

આમ, આપેલ બંને વર્તુળોના છેદબિંદુ $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ તથા $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ છે. આથી માંગેલ ક્ષેત્રનું ક્ષેત્રફળ આકૃતિમાં છાંયેલ છે.

આથી આ બંને પક્ષો x અક્ષ માટે સંમિત હોવાથી માંગેલ ક્ષેત્રનું છે. $A = 2(|I_1| + |I_2|)$

જ્યાં $I_1 = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-(x-1)^2}\, dx$ $\left(\because (x-1)^2 + y^2 = 1 \right.$
$y = \pm\sqrt{1-(x-1)^2}$
પરંતુ આપણે ક્ષેત્ર જે ભાગમાં છે ત્યાં $y > 0$ થાય. $\left.\right)$

$= \left[\frac{x-1}{2}\sqrt{1-(x-1)^2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-1}{1}\right)\right]_0^{1/2}$

$= \left[\frac{\frac{1}{2}-1}{2}\sqrt{1-(\frac{1}{2}-1)^2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2}-1}{1}\right)\right] -$

$\left[-\frac{1}{2}\sqrt{1-0} + \frac{1}{2}\sin^{-1}(-1)\right]$

$= -\frac{1}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) - \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}(-1)\right]$

$= -\frac{\sqrt{3}}{8} + 0 + \frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right]$

$= \frac{8-\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$

$I_2 = \int_{1/2}^{1} \sqrt{1-x^2}\, dx$ $\left(\because x^2 + y^2 = 1 \right.$
$y = \pm\sqrt{1-x^2}$
પરંતુ આપણે ક્ષેત્રમાં
$y > 0$
$y = \sqrt{1-x^2}$ $\left.\right)$

વિભાગ B

14

$$I_2 = \left[\frac{x}{2}\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{1}\right)\right]_{1/2}^{1}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{1-1} + \frac{1}{2}\sin^{-1}(1) - \left[\frac{1}{4}\sqrt{1-\frac{1}{4}} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right]$$

$$= 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right] - \frac{1}{4} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}$$

આમ આપેલ ચક્રીય ક્ષેત્રફળ

$$A = 2(|I_1| - |I_2|)$$

$$= 2\left[\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right)$$

$$= 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$$

$$\boxed{A = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ચો.એકમ}}$$

(11)

$$\frac{dy}{dx} = \sin(x+y) \quad \longrightarrow (1)$$

$x + y = t$ આપેલ છે તેમ,

$1 + \frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx}$ (x પ્રત્યે વિકલન કરતાં),

$\frac{dy}{dx} = \frac{dt}{dx} - 1$ (કિંમત (1) માં મૂકતાં),

$\therefore \frac{dt}{dx} - 1 = \sin t$

વિભાગ..... B .....

15

$\frac{dt}{dx} = 1+\sin t$

$\frac{dt}{1+\sin t} = dx$ જે ચલોવાળ્યા મળ્યા પડ્યું છે.

બંને બાજુ સંકલન કરતાં,

$\int \frac{dt}{1+\sin t} = \int dx$

$I_1 = \int dx$

અહીં $I_1 = \int \frac{dt}{1+\sin t}$

$\tan\frac{t}{2} = h$ આદેશ કરતાં,

$\frac{1}{2}\sec^2\frac{t}{2}\cdot dt = dh$

$dt = \frac{2\,dh}{1+h^2}$

$I_1 = \int \frac{\frac{2\,dh}{1+h^2}}{1+\frac{2h}{1+h^2}}$

$= \int \frac{2\,dh}{1+h^2+2h}$

$= 2\int \frac{dh}{(h+1)^2}$

$= \frac{-2}{h+1} + C$

$= \frac{-2}{\tan\frac{t}{2}+1}$

વિભાગ....B.....

16

$$\int \frac{dt}{1+\sin t} = \int dx$$

$$= \int \frac{(1-\sin t)}{1-\sin^2 t}\,dt = \int dx$$

$$\int \frac{1-\sin t}{\cos^2 t}\,dt = \int dx$$

$$\int \sec^2 t\,dt - \int \tan t \cdot \sec t\,dt = \int dx$$

$$\tan t - \sec t = x + C$$

$$\tan(x+y) - \sec(x+y) = x + C \quad (t = x+y)$$

(12)



→ આકૃતિમાં બે વિચરણ બિંદુઓ એકમ વર્તુળ પર છે જેમાં એક બિંદુ છે P(α) અને Q(π/2+β) વિચરણ કરે છે. આપેલ

$$P(\alpha) = \vec{OP} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$$

વિભાગ B

17

$Q\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right) = \vec{OQ} = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}+\beta\right), \sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)\right)$

$= (-\sin\beta, \cos\beta)$

→ આકૃતિ પરથી $\vec{OP}$ અને $\vec{OQ}$ વચ્ચેનો ખૂણો,

$(\vec{OP} \wedge \vec{OQ}) = \frac{\pi}{2}+\beta-\alpha$

$= \frac{\pi}{2}-(\alpha-\beta)$ છે.

$\cos(\vec{OP} \wedge \vec{OQ}) = \frac{\vec{OP}\cdot\vec{OQ}}{|\vec{OP}||\vec{OQ}|}$

$= \frac{(\cos\alpha, \sin\alpha)\cdot(-\sin\beta, \cos\beta)}{\sqrt{\cos^2\alpha+\sin^2\alpha}\ \sqrt{\cos^2\beta+\sin^2\beta}}$

$\cos\left(\frac{\pi}{2}-(\alpha-\beta)\right) = -\frac{\cos\alpha\cdot\sin\beta+\sin\alpha\cdot\cos\beta}{(1)(1)}$

$\boxed{\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cdot\cos\beta-\cos\alpha\cdot\sin\beta}$

13



વિભાગ B

18

આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 1 એકમ લંબાઈવાળા ત્રણ પરસ્પર લંબ અક્ષો દર્શાવ્યા છે.

ચારે ય કોઈ એક રેખા કે જેની દિક્કોસાઇન (l, m, n) છે તે આ અક્ષો સાથે α, β, γ ખૂણો બનાવે છે. $l^2+m^2+n^2=1$ છે.

આકૃતિ પરથી,

$\vec{OF} = (1,1,1)$ $\vec{BF} = (1,-1,1)$

$\vec{DC} = (1,1,-1)$ $\vec{AE} = (-1,1,1)$ જે પરસ્પર લંબ છે.

આમ આ ચાર રેખા તેની સાથે અનુક્રમે α, β, γ ખૂણો બનાવે છે.

$\cos(\vec{OF}, \vec{i}) = \frac{|\vec{OF} \cdot \vec{i}|}{|\vec{OF}||\vec{i}|}$

$\cos\alpha = \frac{|(1,1,1)\cdot(l,m,n)|}{\sqrt{1+1+1}\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$

$\cos\alpha = \frac{|l+m+n|}{\sqrt{3}}$

એવી જ રીતે $\cos\beta = \frac{|l-m+n|}{\sqrt{3}}$

$\cos\gamma = \frac{|l+m-n|}{\sqrt{3}}$ $\cos\delta = \frac{|-l+m+n|}{\sqrt{3}}$ છે.

વિભાગ.....B.....

19

$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma + \cos^2\delta$

$= \frac{|l+m+n|^2}{3} + \frac{|l-m+n|^2}{3} + \frac{|-l+m+n|^2}{3} + \frac{|l+m-n|^2}{3}$

$= \frac{1}{3}[4.(l^2+m^2+n^2) + 0]$

$= \frac{4}{3}$ $(l^2+m^2+n^2=1)$

(14) બિંદુ A(1,5,1) માંથી સમતલ પર જે દોરેલ લંબ બિંદુ B(a,b,c) છે. જો A થી સમતલ $x-2y+z+5=0$ પર જે લંબપાદ દોરેલ છે. જ્યાં $\vec{n} = (1,-2,1)$ છે. આથી $\vec{AB}$ ની દિશા સમતલના અભિલંબની દિશા સમાન થશે.

$\vec{AB} = (a,b,c) - (1,5,1)$

$= (a-1, b-5, c-1)$

$\vec{AB} = k\vec{n}$ જ્યાં $k \in R-\{0\}$

$\vec{AB} = k(1,-2,1)$

$(a-1, b-5, c-1) = (k, -2k, k)$

બંનેના સંગત ઘટક સરખાવતાં,

$a = k+1$, $b = 5-2k$ $c = k+1$

ઉપરોક્ત આ બિંદુ (a,b,c) એ સમતલ પર પડેલ લંબનો પાદબિંદુ છે. આથી તે તેનું સમીકરણ પણ થશે.

વિભાગ B

20

$k+1 - 2(5-2k) + k+1 + 5 = 0$

$k+1 - 10 + 4k + k + 1 + 5 = 0$

$6k = 3$

$k = \frac{1}{2}$ આમ, ઉંગમબિંદુ.

પછી, $B(a, b, c)$

$= (k+1, 5-2k, k+1)$

$= (\frac{1}{2}+1, 5-2(\frac{1}{2}), 1+\frac{1}{2})$

$= (\frac{3}{2}, 4, \frac{3}{2})$ થ.

દોરેલો છે $(1, 5, 1)$ બિંદુ આપેલ સમતલની બાજુમાં

મળતું બિંદુ $D(x, y, z)$ છે.

આથી, આપેલ ઉંગમબિંદુ એ $\overline{AD}$ નું

મધ્યબિંદુ થશે.

$(\frac{3}{2}, 4, \frac{3}{2}) = (\frac{x+1}{2}, \frac{5+y}{2}, \frac{z+1}{2})$

આનું સરખું દરેકે સરખાવતાં,

$\frac{3}{2} = \frac{x+1}{2}$ $\quad 4 = \frac{5+y}{2}$ $\quad \frac{3}{2} = \frac{z+1}{2}$

$x = 2$ $\quad y = 3$ $\quad z = 2$

આથી આપેલ સમતલનો આપેલ બિંદુ

$(1, 5, 1)$ નું પ્રતિબિંબ $(2, 3, 2)$ છે.

વિભાગ C

15

$r = 8\ m \quad h = 12\ m$

$\frac{dV}{dt} = 4\ m^3/\text{મિનિટ}$

$h' = 6\ m$ ઘડાને * આકારે પાણીની ઊંચાઈ h' અને ત્રિજ્યા r' છે.

આકૃતિ પરથી, ΔAOB અને ΔPOQ એ સમરૂપ ત્રિકોણો છે.

$\therefore \frac{AO}{PO} = \frac{AB}{PQ}$

$\frac{h}{h'} = \frac{r}{r'}$

$\frac{h'}{r'} = \frac{h}{r} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

$h' = \frac{3}{2} \cdot r' \quad \longrightarrow (i)$

આપણે જાણીએ છીએ કે

$V = \frac{\pi}{3} r^2 h'$

$V = \frac{\pi}{3} \left(\frac{2}{3} h'\right)^2 h' \quad$ (સમી. (i) પરથી)

$V = \frac{\pi}{3} \frac{4}{9} h'^3$

$V = \frac{4\pi}{27} h'^3$

$\frac{dV}{dt} = \frac{4\pi}{27} 3h'^2 \frac{dh'}{dt}$

$-4 = \frac{4\pi}{9} (6)^2 \cdot \frac{dh'}{dt}$

$\frac{dh'}{dt} = -\frac{1}{4\pi}$ m/મિનિટ

વિભાગ C

22

પ્રશ્ન 16 નો બીજો ઉપાય $\varepsilon_2 = \frac{1}{4\pi}$ ન્યૂટન/કુલંબ^2

(16) $I = \int e^{4x} \sin 8x \cdot \cos x \, dx$

$= \frac{1}{2} \int e^{4x} (2\sin 8x \cos x) \, dx$

$= \frac{1}{2} \int e^{4x} [\sin(8x+x) + \sin(8x-x)] \, dx$

$= \frac{1}{2} \int e^{4x} [\sin 9x + \sin 7x] \, dx$

$= \frac{1}{2} \left[\int e^{4x} \sin 9x \, dx + \int e^{4x} \sin 7x \, dx \right]$

$= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{4x}}{(4)^2+(9)^2} [4\sin 9x - 9\cos 9x] + \frac{e^{4x}}{(4)^2+(7)^2} [4\sin 7x - 7\cos 7x] \right] + C$

$= \frac{e^{4x}}{2} \left[\frac{1}{97} [4\sin 9x - 9\cos 9x] + \frac{1}{65} [4\sin 7x - 7\cos 7x] \right] + C$

(17) $I = \int_0^1 \tan^{-1}\left(\frac{1}{1-x+x^2}\right) dx$

$= \int_0^1 \tan^{-1}\left(\frac{(1-x)+(x)}{1-x(1-x)}\right) dx$

અહીં $x \in (0,1)$ હોવાથી

$0 < x < 1$ ——— (1)

વિભાગ.....C.....

23

$-1 < -x < 0$ (-1 થી ઓછી ઋણસંખ્યા)

$0 < 1-x < 1$ (1 થી ઓછી ધનસંખ્યા) ⟶ (ii)

હવે (i) અને (ii) પરથી,

$0 < x(1-x) < 1$ મળશે.

$\therefore \tan^{-1}(x) + \tan^{-1}(y) = \tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ જ્યાં $xy < 1$ મળશે,

$\tan^{-1}\left(\frac{(1-x)+x}{1-x(1-x)}\right) = \tan^{-1}(1-x) + \tan^{-1}x$ મળશે

$$I = \int_0^1 \left(\tan^{-1}(1-x) + \tan^{-1}x\right) dx$$

$$= \int_0^1 \tan^{-1}x\,dx + \int_0^1 \tan^{-1}(1-x)\,dx$$

$$= \int_0^1 \tan^{-1}x\,dx + \int_0^1 \tan^{-1}(1-(1-x))\,dx$$

$$\left[\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)\,dx \text{ મળશે}\right]$$

$$= \int_0^1 \tan^{-1}x\,dx + \int_1^0 \tan^{-1}x\,dx$$

$$= 2\int_0^1 \tan^{-1}x\,dx$$

$$= 2\left[\tan^{-1}x \int dx - \int\left(\frac{d}{dx}\tan^{-1}x \cdot \int dx\right)dx\right]_0^1$$

$$= 2\left[x\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\int\frac{2x}{1+x^2}\right]_0^1$$

$$= 2\left[x\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\log(1+x^2)\right]_0^1$$

$$= 2\left[1\tan^{-1}(1) - \frac{1}{2}\log(1+1^2)\right] -$$

$$2\left[0 - \frac{1}{2}\log(1)\right]$$

વિભાગ.....C.....

24

$I = 2\left[\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\log 2\right]$

$\boxed{I = \frac{\pi}{2} - \log 2}$

(18) ન્યૂટનનો ઠંડકનો નિયમ પરથી,

$T - S \propto -T$

$T - S \propto -kT$ જ્યાં k એ અચળાંક છે.

જ્યાં $k > 0$

$\frac{dT}{dt} \propto -(T-S)$

$\frac{dT}{dt} = -k(T-S)$ જ્યાં k એ અચળાંક છે

$k > 0$ છે.

T એ પદાર્થનું તાપમાન છે. તથા S એ આજુબાજુના પરિસરનું તાપમાન છે.

$\frac{dT}{T-S} = -k \cdot dt$

$\int \frac{dT}{T-S} = -k \cdot dt$

$\log(T-S) = -kt + \log C$ (જ્યાં C એ અચળ અચળાંક છે.)

$\log(T-S) - \log C = -kt$

$\log\left(\frac{T-S}{C}\right) = -kt$

$T - S = Ce^{-kt}$ ——→ (1)

Supplementary/પુરવણી

04 - (S)M - 14

વિષય	Maths
તારીખ	16/03/2015

★ અહીંથી જ લખવાનું શરૂ કરવું ★

વિભાગ.....C.....

$t = 0$ સમયે $T = 100^\circ F$ છે.

આપેલ સૂત્ર (i) માં મૂકતાં,

$100 - S = Ce^{-k(0)}$

$C = 100 - S$ ——→ (ii)

$T - S = (100 - S)e^{-kt}$ ——→ (iii)

$t = 5$ સમયે $T = 50^\circ F$ છે.

આપેલ સૂત્ર (ii) માં મૂકતાં,

$50 - S = (100 - S)e^{-k(5)}$ ——→ (iv)

$t = 10$ સમયે $T = 40^\circ F$ છે. આપેલ સૂત્ર (iii) માં મૂકતાં,

$40 - S = (100 - S)e^{-10k}$ ——→ (v)

વિભાગ C

પ્રશ્ન ક્રમાંક 2

આથી (iv) અને (v) પરથી,

$$\frac{50-S}{100-S} = \left(\frac{40-S}{100-S}\right)^2$$

હવે, આથી (iv) નો બંને બાજુ e^{10x} વડે ભાગતાં

$$\left(\frac{50-S}{100-S}\right)^2 = \frac{40-S}{100-S}$$

$$(50-S)^2 = (40-S)(100-S)$$

$$2500 - 100S + S^2 = 4000 - 40S - 100S + S^2$$

$$2500 = 4000 - 40S$$

$$40S = 1500$$

$$\boxed{S = 37.5\,F^\circ}$$

આમ, આપેલ પરિસ્થિતિમાં ઓરડાનું તાપમાન $37.5^\circ F$ છે.